Très distinct par les dessins clairs des élytres ne formant pas, par oblitération, une bande continue distincte, mais deux macules étroites et allongées, l'antérieure nou dilatée sur les côtés, la postérieure subarquée et placée assez loin du sommet.

Dans ses Coléoptères phytophages du Nord africain (1), de Peyerimhoff mentionne plusieurs fois la manière de voir de Heikertinger, c'est pourquoi je me permets de citer à mon tour cet auteur; d'après lui, Psylliodes castanea Ab. serait synonyme de P. Sicardi Weise. Si cette synonymie est exacte (2), une substitution de nom devrait être faite (p. 39) à l'intéressant memoire ci-dessus nommé, étant donné qu'il n'est pas parlé du P. Sicardi Weise.

A suivre.)

M. Pic.

Une variété de « Saprinus « nouvelle pour la Faune française Par le Docteur Auzat

Saprinus detersus Illig. var. Dayremi nov. var. — Se distingue du type d'Illiger par l'absence totale d'espace lisse sur le deuxième intervalle des élytres; de plus, l'espace lisse juxta-scutellaire, au lieu d'être limité en arrière par une ligne à peu près droite, se prolonge beaucoup plus le long de la 4° strie que le long de la suture, s'y terminant en angle aigu; les deux espaces lisses juxta-scutellaires vus ensemble présentent vaguement l'aspect des ailes d'un pigeon au vol.

Plusieurs exemplaires dans ma collection et provenant de Coche (Gers); capturés par mon excellent collègue J. Dayrem.

Se distingue de la var. Navasi Fuente, par l'absence d'espace lisse sur le 2 intervaile et par la strie suturale écourtée en avant, au lieu d'être entière.

Rectification. — A propos de S. detersus Illig., je signalerai une erreur qui a été commise par J. Schmidt dans son travail sur les Histérides (Berl. Ent. Zeitschr. XXIX. 1885, p. 305) et reproduite par Ganglbauer, Reitter et Bickhardt; Schmidt considère S. beduinus Marseul comme une variété de S. detersus Illig.; or, par la présence d'un seul espace lisse justa-scutellaire, et suriout par sa strie suturale double, S. beduinus Mars. mérite de gardér son rang d'espèce propre. Bien que de Marseul n'ait pas parlé de la double strie suturale dans sa description, il l'a fortibién figurée sur son dessin (pl. XI, fig. 8).

Un curieux exemplaire de « Pterostichus femoratus » Dejean

Par le Docteur Auzar

Mon excellent collègue et ami H. Venet, mobilisé en ce moment à Clermont-Ferrand, a pris dernièrement au col·le Cessat un exemplaire mâle très intéressant de Pterrostichus femoratus Dejean.

(1) Ann. Soc. Ent. Fr., 1915, p. 19 à 61.

⁽²⁾ L'auteur autrichien avant une certaine tendance à ne pas juger impartialement les travaux des autres, ceux de certains encomologistes français au moins, d'où, de sa partquelquefois des interprétations inexactes, ou des suppressions abusives.