

Erratum.

Au *Bulletin* n° 8, p. 152 [*Calocala maculata*], ligne 34, au lieu de :
« 1 ♀ type » lire : *Type* : un mâle.

Communications.**Notes sur les variétés et la nomenclature d'*Hololepta plana***

[COL. HISTERIDAE]

par le Dr V. AUZAT.

J'ai dit récemment (*Bull. Soc. ent. Fr.*, [1919], p. 159) qu'un jeune entomologiste, M. ROUQUÈS, avait récolté aux environs de Paris, sur un seul tronc de peuplier, le 17 avril, plus de 80 *Hololepta plana*.

M. ROUQUÈS a bien voulu me les communiquer tous et sur cette nombreuse série j'ai constaté la présence, en une assez forte proportion, de la var. *appendiculata* Auz. (1). En outre, j'y ai trouvé deux variétés nouvelles et qui me semblent mériter une description spéciale. Le tableau suivant permettra d'en juger :

Variétés de l'*Hololepta plana*.

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Front lisse, sans stries transversales. Pronotum sans sillon médian..... | 2. |
| — Front bistré transversalement. Pronotum avec un sillon médian partant de la base et s'arrêtant net au milieu comme un point d'exclamation..... | 3. |
| 2. Élytres sans rudiment apical de 1 ^{re} strie..... | <i>plana</i> s. str. |
| — Élytres avec un rudiment apical de 1 ^{re} strie..... | |
| | var. <i>appendiculata</i> Auz. |
| 3. Élytres sans rudiment apical de 1 ^{re} strie..... | |
| | var. Desbordes , n. var. |
| — Élytres avec un rudiment apical de 1 ^{re} strie..... | |
| | var. Rouques , n. var. |

* *

A propos de l'*Hololepta plana*, M. L. BEDEL m'a fait observer que l'on considérerait à tort FUESSLIN [autrement dit FÜESSLY] comme l'auteur

(1) AUZAT (V.), Histerides gallo-rhéniens, p. 13. (Supplément à *Miscell. entom.*, XXIV, nos 3-4, juin 1918.)

du nom spécifique de cet Histeride, et m'a transmis à ce sujet les renseignements suivants, qu'il m'engage à publier :

Vers 1775, les entomologistes suisses FUESSLIN et SULZER travaillaient de concert, l'un à son catalogue des Insectes de Suisse ⁽¹⁾, l'autre à l'iconographie et au genera des principaux Insectes linnéens ⁽²⁾. C'est ainsi que FUESSLIN (l. c., p. 5) a pu citer, d'après les planches de SULZER, déjà tirées, le nom et la figure de l'*Hister planus*, mais lui-même ne l'a jamais décrit; il se borne à dire que « ce remarquable Escarbot a été trouvé par le Dr AMSTEIN à Bündten, dans les écorces d'un *Populus nigra* depuis longtemps abattu ». Par contre, en 1776, SULZER (l. c., pars I, p 23) a publié une suffisante description de l'Histeride qu'il avait nommé et figuré dans l'atlas de son ouvrage. C'est donc lui qui est l'auteur du nom spécifique de l'*Hololepta plana*.

**Description des deux sexes, de l'œuf et de la larve primaire
d'un nouveau *Rhipidius* de Provence**

[COL. RHIPIDPHORIDAE]

par le Dr A. CHABAUT.

Rhipidius Denisi, n. sp. — ♂. Entièrement noir en dessus et en dessous, avec la base des lamelles antennaires et les tarses plus clairs, l'extrémité des élytres blanchâtre; téguments coriacés; partout recouvert d'une pilosité assez longue, noirâtre.

Tête subquadrangulaire, plus longue que large, à angles postérieurs droits, bien marqués. Yeux très développés, fortement granuleux, contigus en dessus et en dessous, n'occupant sur le dessus de la tête qu'une étroite bande transverse, à peine égale au quart de la longueur de la tête, situés en avant, un peu en dessous de l'insertion des antennes; bien plus développés en dessous, ils y occupent en avant plus de la moitié de la surface.

Palpes maxillaires de deux articles, le dernier cylindrique, quatre à cinq fois aussi long que l'article basal. Antennes de onze articles, les huit derniers munis en dedans d'une longue lamelle dilatée à l'extré-

(1) J.-C. FUESSLIN, Verzeichnis der Schweiz. Ins. (un volume de texte, avec planche coloriée).

(2) H.-G. SULZER, Abgek. Geschichte der Ins. (en deux volumes, l'un de 32 planches coloriées, l'autre de texte seulement).