

Edemera podagrariae v. nov. *inlateralis* ♂. Elytris testaceis, apice metallico notatis, femoribus posticis ad basin testaceis, apice nigris, his crassis. Grèce (coll. Pic).

Edemera podagrariae v. nov. *distinctipes* ♂. Normaliter coloratus sed femoribus posticis parum crassis, his nigris, ad basin breve testaceis. Mont Athos (coll. Pic).

Lissotarsus alboguttatus v. nov. *subelongatus*. Oblongo-elongatus, rufus, luteo aut albo squamulatus, thorace elongato, in disco carinato. Long. 4 mill. El Goleah (coll. Peyerimhoff). — Plus allongé que *alboguttatus* Bris, avec le prothorax plus long, les tibias antérieurs sans forte dent médiane et le dessus ne présentant pas de macules foncées.

(A suivre.)

M. Pic.

Nouvelle note sur les Histérides français

PAR LE D^r V. AUZAT

Notre excellent collègue M. Fagniez, m'ayant soumis dernièrement les Histérides qu'il a chassés depuis peu aux environs de la Bonde (Vaucluse), j'en vais citer ici les plus intéressantes de ses captures.

D'abord *Saprinus sparsutus* Solsky, nouveau pour le département de Vaucluse, de même que *Saprinus deterius* Var. *Dayremi* Auzat ; ensuite, plusieurs exemplaires de *Saprinus deterius* Var. *Navasi* Fuente, variété nouvelle pour la faune française.

Et enfin, parmi de nombreuses brochettes de *Saprinus nitidulus* Paykull, trois exemplaires très intéressants de cette espèce chez lesquels la strie suturale, au lieu d'être écourtée en avant comme celle des exemplaires typiques, est entière et se raccorde par un arc basal à la 4^e dorsale. Cette variété très rare (3 exemplaires sur 1.000 environ) prendra le nom de « VAR. FAGNIEZI NOV. VAR. ».

Diagnoses de Coléoptères exotiques

(Suite)

Silidius lineatocollis n. sp. Oblongus, postice paulo dilatatus, subopacus, niger, thorace testaceo, in medio nigro-lineato, breve, antice subarcuato, elytris testaceis, apice nigro notatis, costatis. Long. 12-13 mill. Afrique Orientale (coll. Pic) (1). A placer près de *subcostulatus* Pic.

Silidius tanganikanus n. sp. Parum elongatus, niger, capite antice et postice, thorace lateraliter pro parte et femoribus anticis ad basin rufis, elytris testaceis, apice late

(1) Ainsi que les espèces suivantes.