

Notes sur les Histerides

(Suite)

Par le Dr V. AUZAT.

Hister quadrimaculatus var. **bipunctulus** nov. var. — C'est la variété *sinuatus*, dont les deux bouts internes de la tache rouge sont réunis par un pont longitudinal de même couleur, laissant un point noir au centre de la tache discale rouge ainsi formée; rappelle, à première vue, l'*H. bipunctatus* Payk. — Asie-Mineure, ex BICKHARDT; coll. AUZAT.

• **H. capsirensis** nov. spec. — Se place parmi les espèces dépourvues de strie subhumérale et à strie latérale externe du pronotum raccourcie en arrière, entre *H. funestus* Er. et *H. bissextriatus* Fabr.; quatre stries dorsales aux élytres, mandibules à bord externe émoussé; strie frontale sinuée en arrière en son milieu, comme chez *bissextriatus*, tandis que chez *funestus* elle est droite; propygidium éparsément ponctué comme dans ces deux espèces. — Capsir, Montlouis, Escorial; coll. AUZAT.

Saprinus rugifrons var. **Girondinus** nov. var. — Variété de *rugifrons* Payk., dont la première strie dorsale des élytres se prolonge jusqu'à l'apex, comme chez *S. metallicus* Herbst. Se distingue facilement de ce dernier par la sculpture frontale, la ponctuation beaucoup plus forte des élytres et surtout par la denticulation de ses tibias antérieurs qui est très différente. — Cazaux (Gironde); coll. AUZAT.

Ces variétés seront décrites plus amplement dans l'ouvrage en cours de publication : *Les Histeridae gallo-rhéniens*, par le Dr V. AUZAT.

Etude de la *Chrysomela graminis* Lin.

Par M. P.-M. MALLET.

Cette espèce, citée comme rarissime dans le bassin de la Seine (BEDEL, *Phytoph.*, p. 261), est cependant extrêmement commune à Montargis (Loiret), dans les prairies marécageuses bordant les rivières du Loing, du Vernisson et du Puisseaux.

La plupart des auteurs (DE MARSEUL, WEISE, REITTER, KUHN), l'indiquent comme vivant sur *Achillea ptarmica* et *Tanacetum vulgare*. Ce ne sont pas ses seules plantes nourricières; elle vit aussi sur *Achillea millefolium* (F. TAUPIN), et sur quelques labiées, notamment sur *Lycopus europaeus*, sur lequel j'ai pu prendre, en juillet dernier, plus de 300 exemplaires de cette espèce, dans lesquels figuraient 3 % de variétés *fulgida* Fabr.