

vole, ses mandibules ouvertes, et qui, lui aussi sans doute, est guidé par l'odorat.

Depuis douze ans environ, je surveille régulièrement chaque année une quinzaine de plantes, soit à Nîmes, soit dans ma petite propriété aux environs du Pont-du-Gard. Je crois inutile d'énumérer la liste complète des espèces que j'ai prises jusqu'à ce jour; ce qui serait intéressant, ce serait de comparer le contenu de ces spathes dans diverses régions de France. Je citerai seulement quelques espèces, réputées rares, que j'ai eu la bonne fortune de prendre, mais en très petit nombre, il est vrai, telles que *Saprinus laetus* Er., *Saprinus algericus* Payk., *Saprinus speculum* Schm., *Saprinus Pelleti* Mars.

Ainsi il m'est passé sous les yeux des centaines et des centaines de *Saprinus*, puisqu'il m'est arrivé d'en compter près d'un millier dans une seule inflorescence.

Je crois bon de signaler une variété inédite de *Saprinus furvus* Er., parce qu'elle fait le pendant de la variété *Fagniezi* Azat, de *Saprinus semistriatus* Scrib. C'est dire que la strie suturale y est entière, bien marquée, et reliée à la quatrième strie dorsale. Je propose le nom de var. **Cabanesi** nova.

Je remercie tout spécialement notre savant collègue, M. le Dr AZAT, de son aide précieuse et de l'encouragement qu'il ne cesse de me prodiguer.

Nîmes, le 4 septembre 1931.

Notes sur les Histérides

par le Dr V. AZAT

Saprinus æneus F. var. **Therondi** nov. var. — Cette magnifique variété a été recueillie dans les spathes d'*Arum dracunculus* L. Elle se distingue du type par sa troisième strie élytrale aussi longue que les autres et divisant longitudinalement en deux le miroir externe; de plus, la strie suturale est gémée dans toute sa moitié postérieure.

Rappelle en plus petit le *S. Brenskei* Reitter, de Grèce.

Nîmes : un seul exemplaire. Coll. J. THÉRON.

Carabus auratus

par P. SIREY

M. BARTHE (*Miscell.*, XXV, n° 7) écrit qu'il « sera bientôt nécessaire de publier une révision de l'ensemble des *Carabus* de la région franco-rhénane ». Cette révision s'impose et ne sera d'ailleurs pas définitive.

J'ai étudié un certain nombre de formes nouvelles de différentes espèces, telles que *splendens*, *purpurascens* et notamment *monilis*, dont j'ai établi un tableau complet comportant de notables additions.

M. BARTHE écrit les lignes ci-dessus en commentant une étude du *C. auratus* par M. BORN.